

Consejería /orientación post-parto en el contexto de la epidemia del **ZIKA**

RECIBA AMABLEMENTE A LA USUARIA

Bajo riesgo de Zika

De atención post-parto siguiendo los pasos de las normas nacionales de atención preconceptual, prenatal, parto, nacimiento y puerperio del MSPBS.

Determine el riesgo de contraer Zika:
 - ¿En su casa hay muchos mosquitos?
 - ¿En su casa ha habido o hay alguna persona enferma de Zika?
 - ¿Su pareja o usted han estado enfermos de Zika?

Alto riesgo de Zika

Investigue infección por Zika.

NO

Antecedente de Zika en el embarazo

SÍ

Verifique si la mujer y su pareja han tenido o tienen signos o síntomas de Zika. **EXANTEMA MÁCULO-PAPULAR CON DOS O MÁS DE LO SIGUIENTE:**
 ▶ Fiebre leve, conjuntivitis no purulenta.
 ▶ Cefalea, mialgia, astenia, dolor retro-orbitario.
 ▶ Edema en miembros inferiores, anorexia, vómitos, diarrea y/o dolor abdominal.

Revise la prueba de laboratorio de la madre.

NO

RN con síndrome congénito asociado al Zika o microcefalia

SÍ

- ▶ Dé la consejería/orientación en atención post-parto.
- ▶ Información para protección personal, de la vivienda, sus alrededores y del recién nacido contra el Zika.
- ▶ Explique el riesgo de la infección del virus del Zika para la salud del recién nacido y enfatice el uso de condón masculino y femenino para evitar transmisión sexual del Zika.

Corrobore si se han indicado pruebas para Zika a él y a su madre, llene la ficha de notificación obligatoria y repórtelo a Vigilancia de la Salud.

- Brinde apoyo psicosocial básico.
- Explique que el RN deberá ser referido para evaluación y seguimiento apropiado.
- Brinde consejería en la atención post-parto.

Refiera a la madre para apoyo psicológico de ser necesario. Refiera al recién nacido para tratamiento/seguimiento.

Acuerde próxima cita.

Explique que debe llevar al niño a sus controles y monitoreo del crecimiento mensualmente, porque es muy importante asegurar que el sistema nervioso del bebé se desarrolla normalmente. Recuerde que puede haber manifestaciones tardías del Síndrome Congénito asociado a Zika.

Recuerde que el condón masculino o femenino es el único método que evita ITS como el VIH y Zika.

