



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

PROYECTO ASSIST
DE USAID
*Aplicando la Ciencia para Fortalecer
y Mejorar los Sistemas de Salud*

Procedimiento: Consejería sobre Zika en Atención Prenatal		Evaluación		
		1	2	3
PASO 1	ATENDIO A LA USUARIA			
	Saludó a la usuaria			
	Mantuvo una actitud amable			
	Se presentó ante la usuaria			
PASO 2	DETERMINÓ EN CADA CONTROL EL RIESGO DE CONTRAER ZIKA			
	Indagó la presencia de zancudos en la vivienda			
	Indagó presencia de personas enfermas en el lugar de residencia			
	Indagó sí la pareja trabaja en o viaja a lugares donde hay personas con Zika			
	Indagó sí la pareja o la usuaria han estado enfermos de Zika			
PASO 3 A	BAJO RIESGO DE ZIKA			
	Brindó atención prenatal de acuerdo a normativa de MINSAL			
	Investigó si ella o su pareja han presentado síntomas de Zika			
	Explicó las posibles vías de transmisión del Zika			
	Explicó los síntomas de Zika por los que debe consultar			
	Explicó medidas ambientales y personales para la prevención del Zika			
	Explicó riesgo y consecuencias de la infección por Zika durante el embarazo			
	Entregó repelente y condones			
PASO 3 B	SI LA EMBARAZADA O SU PAREJA SON CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE ZIKA EN LA GESTACIÓN ACTUAL			
	Brindó atención prenatal de acuerdo a normativas de MINSAL para la atención integral de personas con Zika			
	Explicó medidas ambientales y personales para la prevención del Zika			
	Determinó si tomaron pruebas para Zika			
	Verificó si hay confirmación laboratorial del diagnóstico de Zika			
	Determinó sí las pruebas fueron tomadas oportunamente; es decir, rRT-PCR en las primeras dos semanas e IgM para Zika entre dos y doce semanas posteriores a las manifestaciones clínicas.			
	Explicó riesgos y consecuencias, para el recién nacido, de la infección de Zika en el embarazo			

PASO 3 B	Informó que le realizarán ultrasonografías con más frecuencia para el seguimiento de su embarazo por el antecedente materno de Zika.			
	Verificó resultados del ultrasonido obstétrico y lo documentó			
	Ultrasonido con sospecha de la presencia de Síndrome Congénito asociado a infección por virus de Zika			
	Expresó empatía con la usuaria.			
	Dió mensajes de apoyo.			
	Enfatizó que es una sospecha y que deberá corroborarse luego del nacimiento de su bebé.			
	Explicó que debe tomar todos los ultrasonidos indicados, especialmente aquellos entre las 28 y 30 semanas.			
	Explicó a la paciente que no es culpa suya haberse infectado.			
	Incluyó a la pareja y explicó que el niño parece estar infectado y que necesitará evaluaciones después de nacer para comprobarlo.			
Brindó apoyo psicosocial y refirió a psicólogo si fue necesario.				
PASO 4	Verifica comprensión de la información			
	Enfatizó en el apego de los controles.			
	Aclaró que puede consultar en cualquier momento al presentarse alguna anomalía.			
PASO 5	Acordó fecha de próxima cita			